

薬剤部からのお知らせ

2022年10月26日

◆新規採用薬品

※※2022年10月28日(金)より採用になります(下記薬品)※※

2499〈副腎癌化学療法剤、副腎皮質ホルモン合成阻害剤〉

オペプリム「劇」 Opeprim 【規格】 500mg1カプセル 〈薬価〉 729.2円/カプセル 株式会社ヤクルト本社	ミタンカプセル	【効能・効果】 ○副腎癌 ○手術適応とならないクッシング症候群 【用法・用量】 通常成人1回1カプセル～2カプセル1日3回経口投与から開始し、有効量まで漸増し、以後、症状、血中・尿中ステロイド濃度、副作用等により適宜増減する。
--------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※受注発注薬品になりますので通常院内に在庫はありません。必要時薬剤部へ連絡をお願いします。

◆採用切り替え薬品

※※2022年11月1日(火)より供給停止のため採用切り替えになります(下記薬品)※※

セファゾリンNa注射用1g「NP」	⇒	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」
-------------------	---	-----------------------

6132〈合成セファロスポリン系抗生物質〉

セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 Cefazolin 【規格】 1g1瓶 〈薬価〉 263円/瓶 日医工株式会社	注射用セファゾリンナトリウム	【効能・効果】 長文につき添付文書をご参照ください。 【用法・用量】 セファゾリンとして、通常、1日量成人には1g(力価)、小児には体重kg当り20～40mg(力価)を2回に分けて緩徐に静脈内へ注射するが、筋肉内へ注射することもできる。 症状及び感染菌の感受性から効果不十分と判断される場合には、1日量成人1.5～3g(力価)を、小児には体重kg当り50mg(力価)を3回に分割投与する。 症状が特に重篤な場合には、1日量成人5g(力価)、小児には体重kg当り100mg(力価)までを分割投与することができる。 また、輸液に加え、静脈内に点滴注入することもできる。
---------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆採用削除薬品

※※2022年11月1日(火)より採用削除になります(下記薬品)※※

ヒューマトロープ注射用12mg